

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Ce document à pour objet de définir et préciser les modalités de prise en charge de la douleur.

OBJECTIF

Ce protocole a pour objectif d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients, et la sécurité des soins.

RESPONSABLES ET ACTEURS AUTORISES

Responsables : médecins de l'unité.

Acteurs : interne ; IADE ; IDE en unité de soins palliatifs.

DONNEES D'APPLICATION

Exigences externes : CSP ; référentiel (v2010, mars 2011) HAS de certification.

Exigences internes : Politique qualité de l'établissement.

INDICATEURS DE MESURE ET SURVEILLANCE

Nature et fréquence de survenue des d'événements indésirables ; indicateur satisfaction patients et IPAQS.

EN ≥ 5 ou Algoplus ≥ 3

1. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Signaler l'utilisation du protocole après chaque usage, lors de la visite du médecin du service et de l'infirmière algologue et **tracer** dans le dossier de soins.

Attention à la prise récente de pallier II

Ce protocole n'est pas applicable en cas de douleur thoracique, de céphalées brutales et intenses.
Ne pas appliquer si TA < 90 mmHg ou TA > 180 mmHg.

Pas d'application du protocole en cas d'allergie à l'un des produits.

Pas d'ACUPAN® (NEFOPAM) en cas de notion d'épilepsie.

Pas de **Kétamine**® en cas de porphyrie.

Utilisation prudente de la Morphine chez le patient obèse et chez l'insuffisant respiratoire.

Si Age du patient > 80 ans ou poids < 50 kg : diviser les doses par 2.

REVISION ET APPROBATION				
	FONCTION		DATE	VISA
REDIGEE PAR	Médecin CLUD IDE CLUD	Dr Jeanne Marie REGNIER Béatrice MARIANI		
REVUE PAR	Médecin CLUD IDE CLUD Dir. Soins Infirmiers	Dr Jean Loup SERGENT Angéla TOFANI Gilles ANDREANI		
VALIDEE PAR	Président CME	Dr Vincent MARTELLI		
Date d'application :		Périodicité de révision : annuelle		

2. APPLICATION

8> EN >5 ou Algoplus >3 = douleur MOYENNE

ACUPAN 20 mg sur un sucre

+	TOPALGIC 100 mg IVL
---	---------------------

Si mal toléré : mise en œuvre du protocole
« PT_SOI_59 Titration morphine »

Evaluation à 1 heure :

- ✚ EN <3 ou Algoplus <2 : pas d'action supplémentaire
- ✚ EN >3 ou Algoplus >2 : appliquer le protocole titration morphine

EN >8 ou Algoplus >4 = douleur FORTE

ACUPAN 20 mg sur un sucre

+	TOPALGIC 100 mg
+	KETALAR 10 mg
+	MORPHINE 0,05 mg/kg
+	DROLEPTAN 0,5 mg
Le tout, dilué dans NaCl 9% 100 ml	

Evaluation 1 heure après la mise en place du traitement:

- ✚ EN <3 ou algoplus <2 : pas d'action supplémentaire
- ✚ EN >3 ou algoplus >2 : **prévenir le médecin** du service